

FRAGMENTA
CHIRURGICA & MEDICA.

AUCTORE GUL. FORDYCE M.D. EQ. AUR.



LONDINI:
Ex Officina T. Spilsbury.
PROSTANT APUD T. CADELL.
MDCCLXXXIV.



IOANNI ELIOT
EQ. AVR. ET BARONETTO;
MEDICO,
SI QVIS ALIVS, IN IPSA SCHOLA
HIPPOCRATICO-BOËRHAVIANA
NATO;
HÆC QUALIACVNQVE FRAGMENTA,
HONORIS ERGO ET AMICITIÆ,
L. M. D. D. Q.
GVLIELMVS FORDYCE.



LECTORI

S.

QUUM a primis fere annis ad artem medicinalem præ ceteris animum adungere destinaram, ex ephebis egressus in id studii genus omni cogitatione incubui; auspice fratre, attentissimo olim magni Boërhavii auditore et discipulo. Tali duce, libros inter et ægrotos quotidie versans, passim conquifivi, ac totus in hoc eram, ut novi aliquid addicerem. Quandocunque autem legenti, vel percontanti, sese obtulisset insigne aliquod ægrotantis exemplum,

plum, observatio quævis, aut significatio tantilla, unde clarior instituto adfulgeret lux, ea literis fidi continuo mandavi, ut ad normam postea, occasione data, singula exigerentur. Quæ tunc adnotare exorsus eram, volventibus annis, cum crebra recensione magna cepere incrementa. Multa enim didici ex nosocomiiis tam peregrinis quam domesticis : plura suppeditavit propria et publice et privatim per longam annorum feriem experientia.

Nunquam mihi per otium concessum est theorias subtiles subtiliter texere ; neque illuc profecto animus nunc fert, quippe
quæ

quæ magis curiosæ mihi semper
visæ sunt, quam reipublicæ medicæ
unquam fructuosæ. At vero de
iis, quæ docuit usus diutinus (qua-
lia ea cunque sint) cepit deside-
rium junioribus impertiendi, qui-
bus in iisdem studiis eadem obtige-
rit animi intentio, idem ardor.

Libellus FRAGMENTA tantum
audit. Ea certe licuit domi pres-
sisse, dum in formam justî ac legi-
timi operis, quæ in medium habeo
proferenda, maturuissent; sed nego-
tiis in dies districtior, et acer-
rima febrium malignarum vi sæ-
pius admonitus quam caducæ sim
et incertæ vitæ, satius credidi par-
tem

tem in praesentia vulgare, quam in longinquum tempus omnia differre.

Recte statuerim, an secus, aliorum est judicium. Juvat interim recolere, cives nostros, quorum animum benignum plus semel expertus sum, haud omnino adspernaturos conamen aliquod, utcunque leve et exiguum, unde generis humani dolores aut amoveantur aut subleventur.

Dabam Londini

Prid. Id. Dec.

M. DCC. LXXXIV.

FRAGMENTA
CHIRURGICA
ET
MEDICA.

ABSCESSUS JECINORIS.

EDuardus Stanfell, tertiæ cohortis prætorianæ miles, vicesimum agens annum, febre biliosa ineunte mense Septembri correptus est : nec in valetudinarium cohortis nisi post dies quatuordecim deferatur, febre jam onustus, cum ictero superaddito. Rhabarbari ope, salium neutrorum usu, vomitu, &c. se remisere febrilia symptomata ; rediitque corpori color

B

suus.

suus. Mansit tamen circa regionem hepaticam, vel gastricam, dolor quidam vix unquam cessans. Ibidem porro loci gravitatis sensus erat præter consuetudinem. Jamque febris accessio postmeridianis ac vespertinis horis urgere cœpit; quæ utique proxima luce, ut in phthisicis fieri consuevit, in effusum sudorem abiit. Cum crescente in dies dolore ortus est intus tumor; graduque concitato æger emarcescebat. Tumor in exteriorem partem magis magisque ferebatur. Figura ejus rotunda; pressus vero digitis nusquam cedebat. Vir jure magni nominis Gulielmus Hunter, qui rogatu meo hominem invisere dignatus est, in eandem mecum concurrit opinionem, materiam aliquam malam corruptamque in hepate coiisse, quam ferro forsitan contingere liceret. Ægrum adeo monuimus, quanto vita in periculo esset, quamque nulla de salute reliqua foret spes, ni chirurgi in manus omni
abjecta

abjecta mora se tradidisset. Neque abhorrebat ille, miles impiger. Secans igitur per oram lineæ rectæ a parte dextra, ingenti puris fœtidi copię exitum præbui: quo emisso, cannulam plumbeam in cavitatem inferui, superdatis postea solitis glutinantibus. Corpus quam citissime pristinam magnitudinem implevit. At vero a cibo, aut post quotamcunque intemperantiam, venter inflatus atque distensus fiebat; omnino ac si residua jecinoris pars (pars illa qua nihil abscesserat) necessariam bilis copiam non esset sufficiendo. Quod in isthac minus erat, rhabarbaro pensavi et extracto chamæmelino, per temporum intervalla exhibitis. Elapso fœsquimenſe, sanatum est vulnus; inflatio omnis resedit; et salus absolutissima subsequuta est.

ABSCESSUS JECINORIS,

PER DIAPHRAGMA IN PULMONEM PENETRANS.

NAuta quidam, cui nomen Bertrand, dum in reditu ex India Orientali promontorium Bonæ Spei præterveheretur, gravi dysenteria implicitus erat. Is me convenit mense Januario M,DCC,LXXII; quo tempore, ex sudoribus nocturnis, purulenta expectoratione, ac febris hectica, laborantis phthisi pulmonali speciem dabat. Sex ante me conventum hebdomadas detractus fuerat sanguis: id quod in malo pleuritidem referente paulo serius fiebat. Intra diem enim quartum decimum solita phthiseôs pulmonalis signa morbus repræsentabat. Prodebat sese præterea tensio in hepatis regione; item tumor inter secundam ac tertiam lateris dextri costas nothas. Hunc tumorem, quoniam ab inclusa in cavo thoracis materia proficisci videbatur, mihi visum est et Joanni Hunter pure exonerandum esse. Cui medicinæ
quum

quum artifex ille eximius postridie, me comite, accinxisset ; ecce excreantem ægrum rufæ multum purulentæ materiæ, acerba simul divexante tussi. Nihilo tamen secius optimum factu duximus apertionem tumoris instituere ; quippe quum non liquido pateret, illi virium satis suppetere ad tantam materiæ copiam extuflendam. Dempti sunt optime cocti puris ad sextarios quatuor ; costæque ora cariota reperiatur. Anhelosæ respirationis, itidem purulentæ expectorationis symptomata, in auras dissipata sunt : dormiebat quoque æger plus minus. Ut febris subveniretur, nitrum sumpsit ex mixtura salina Riveriana, cum elixire paregorico, et eclegmate molliente balsamico. Sibi vero nullo pacto temperare voluit, quo minus carne, ostreis, cerevisia forti, et quæ similia sunt, vesceretur. Ora vulneris inter hæc malam faciem induebat : deciderunt escharæ : idque quod se promebat, sanguineum, faniosum, purulentum, per vices erat. Perfliterunt

stiterunt hecticæ symptomata: respiratio venæsectione relevata est: ad intervalla venter resolutus, stercore hic illic materia interstincto. Martiis calendis sequuta est mors. Die postero, dum intestina secti cadaveris lustraremus, materiam usquequaque in jecinore sparsam deprehendimus. E costis duæ in longitudinem usque duorum vel trium digitorum computruerant. Et, quæ animadversione dignissima res est, jecur diaphragmati arcte adhærebat; per quod in dextri pulmonum lobi partem pus sibi viam eroserat: constabat enim, abscessum pulmonis priori in jecinore abscessui ortum debuisse. Aliæ et erant in jecinore suppurationes minores, quibus nulla cum majori intercesserat communicatio. Cetera viscera omni labe carebant; induratis duntaxat mesenterii glandulis.

Talium forte suppurationum interpositæ hydatides e cavo abdominis per tracheam alias transmissæ sunt. *

* Vide Medical Transactions, vol. ii. p. 486.

ÆGRITUDINES AD ANUM.

Variæ sunt et molestissimæ ad anum ægritudines. Earum præcipuæ, cum aptissima cuique curatione, sequuntur.

1. Prurigo intoleranda, cum ardore, et acri profluente ichore : cui malo in totum tollendo vix dum innotescit remedium. Plus illi quidem ex Heisteri, quam ex alius cujusvis præscriptis, levamenti est. Istiusmodi pruriginem, nullo eam profluvio ichoroso comitante, novimus interdum fanari lacrimis stanni Cornubiensis in pulverem redactis, vel ipsa limatura ejus. Hoc idem docet honoratissimus olim materiæ medicæ præceptor meus Carolus Alston. *

2. Rhagades lue venerea derivatæ : quæ haustis ex radice sarsaparillæ decoctis sanationem debituræ sunt, si modo rite præcefferit

* Medical Essays, vol. v. p. 89.

cefferit hydrargyrosis. Vide quæ de hac re alibi exequutus sum. †

3. Ulcera vetustiora tortuosa cum fistulis, ex eadem lue male in perinæo curata ortum ducentia: quibus optime succurritur asperiore regimine antivenereo, cereolis, rusticatione, ac victu pleniore.

4. Ulcera vetustiora tortuosa cum cachexiæ symptomatibus: quorum omne auxilium petendum est a pastillis, quos in remedium fistularum confecit celebris medicaster, quem nuper vidimus, Joannes Ward. Equo vehi sub his licet, aliove modo se exercere. Nulla interim partis affectæ, nulla de cibis, interponenda est cura.

5. Hæmorrhoides in turgido statu collisæ, sic ut dolorem intolerandum efficiant: quas tamen sæpius pelli videre est per simplicem incisionem, nulla partis affectæ habita ratione, neque imposito aliquo penicillo.

6. Hæ-

† Appendix to Review of the Venereal Disease,

6. Hæmorrhoides jam in pus vergentes, cum dolore vehementissimo, simul et duritie ad ora venarum: quod ut submoveatur vitium, copiose per lanceolam evocandus est humor noxius, prius etiam quam maturentur capitula. Omne penicillum alienum est.

7. Ani procidentia, ab imbecillitate muscutorum oriunda: cujus efficacissimum positum est remedium in fomentis ex aqua, in qua candens ferrum subinde extinctum sit, et cortex quernus decoctus. Utilissimum quoque vinculum est a Benjamino Gooch repertum. His autem addantur tincturæ Thebaicæ injectiones, si ex affectuum dysentericorum reliquiis in intestinum rectum regestis ortum sit malum.

A S T H M A.

FLOYERI tractatus de variis hujusce morbi speciebus unus solus pluris habendus est quam reliqui omnes super eodem argumento conscripti libri.

In purulento genere, quod fere senum est, quæcunque urinam movent adprime conveniunt: qualia sunt gummi ammoniacum, millepedæ, et scilla. In genere nervoso, nihil æque prodest atque cortex Peruvianus. Recte dantur, in hysterico, solutiones e gummi.

Pauci sunt suspiriosi, qui vitam omnino sufferre possunt in hac urbe, spirante, dum ardet Sirius, vento austro-occidentali. Repentinas cœli mutationes plerique omnes nimium sentiunt.

Acetum et oxymel scilliticum, mirum quantum polleant, sive separatim sumpta fuerint, sive aliis juncta medicamentis,
nitro

nitro puta vel cortice Peruviano ; maximeque ubi noctu fiunt accessiones.

In omni hoc affectu, ut ne quid in victus ratione peccetur, summa cautio est. Ex traditis mihi ægris nonnullos vidi quasi mox jugulandos, nisi potui datum esset acetum aquæ frigidæ mistum.

CALCULUS VESICÆ FELLÆ.

MAtrona Francesca Stewart in Cavendish-square habitabat. Hanc, podagrica stirpe genitam, alvus tardior biliosque affectus per maximam vitæ partem infestaverant. Sub mensium tandem cessationem, vehementissimis lacerata vomitionibus, arquata evasit ; paucasque intra hebdomadas, sævis nunc circa regionem gastricam sollicitantibus spasmis, graviterque vexantibus bilis flavæ acrioris dejectionibus, piriformis illa calculi dimidium excrevit. Cessabant simul symptomata o-

nia. Post aliquot dies, quum summa animi hilaritate cibo pleniori indulgeret, subito exclamans "Proh latus meum!" manum dexteriori regionis hypogastricæ parti admovit, animamque efflavit.

Causam mortis tam inopinatæ cultro anatomico requirens, ductum choledochum inveni crassitudinem vesicæ felleæ prope habentem: calculus enim, quamdiu hisce in locis morabatur, utriusque cavo impleto, ad utriusque figuram plane conformatus erat. Id vero quod maxime notatu dignum est: Reliqua calculi pars, dum per coli valvulam iter moliretur, subitam acrimonia sua, ut videbatur, convulsionem excitaverat, unaque intestinum ruperat; cujus in vulnere pertinaciter infidebat, non deficiente tamen ad sensum satis amplo transeundi spatio. Inventus quoque est intra pelvim tumor scirrhusus pugni magnitudine, qui adstrictionem istam alvi, unde antea tot cruciatus, forsitan adauxerat. Nulla alia erant noxæ signa.

Veri-

Verisimile est, bilem cysticam, simul cum descendente calculi parte rapidius erumpentem, tantis illis inter profluvium doloribus in causa extitisse.

Ex eo quod altera pars calculi intestino rupto mortem statim adtulerat, minime mihi dubitandum videtur, fata acerba tot infantum, nervorum distensione abreptorum, acriori cuidam in ventriculo aut visceribus materiæ deberi, intestinorum tunicas eodem fere modo subito afficienti; quas quidem tunicas apertis cadaveribus sæpenumero vidi aliquibus in locis quasi elixas.

CAPITIS DOLOR.

MILES tertiæ cohortis prætorianæ, cognomento Green, in valetudinarium exceptus est anno M,DCC,L, atroci cephalalgia tentatus. Ei primum pertusa est vena; deinde vomitoria, purgantia, et cum diluentibus

entibus nitrosa, in usum vocata sunt. Quæ omnia quum nihil proficerent, emplastro vesicatorio dorso injecto, et adjuvantibus radicis valerianæ silvestris dosibus, ante emensam hebdomadem liberatus est.

§.

Uppinghamiæ Franciscus Bennett, quum triginta tres annos haberet, gravissima laboravit cephalæa, ne semel unquam per sex menses dimittente. Continuata demum duarum integrarum hebdomadum vigilia, auctores fuerunt amici, ut fronti, qua maxime parte urgebat dolor, hirudines adfigerentur. Quod adeo factum est. Magna dein copia sanguinis sequente, altus illum occupavit sopor. Experrecto tanta iterum copia manavit sanguis, ut æger rime sisteretur. Nunquam postea indoluit ei caput, etiam ex hesterno Iaccho; ut ipse monuit septuagenarius.

CINGULUM MERCURIALE.

FILIA calcearii cujusdam Woodcock, in Glaston vico Rutlandiæ degentis, scabie contracta, remedii loco cingulum induta est, quæ exceptum erat argentum vivum; nullo ante diem tertium oriente incommodo. Tum vero insigni angore, et angustiiis circa præcordia, correpta est; invadentibus frigidis sudoribus, nausea, capitis dolore, ac nervorum ad tetanon usque distensione. Duraverunt ea omnia per totam istius diei noctem; in tantum quidem exacerbata, ut ad ultima jam prope ventum esset. Sanguinem floridi coloris effuse vomuit, duasque minimum sanguinis concreti libras per vulvam emisit: nec mediocre per alvum ejusdem erat profluvium. In tam præcipiti periculo arcessitus, multa sciscitando, ac de veneno et veneni effectibus, ut verum elicerem, pluribus

pluribus differendo (me enim rem actam celaverat tota conscia familia) tandem eam comperi zona cinctam mercuriali. Qua statim exuta, haustum affatim obtuli, qui habet Olei amygd. dulc. unc. vi. Lact. recent. tepid. lib. vi. His vomitu redditis, bolum ex aquæ menthæ cyatho exhibui, in quo erant Camph. gr. v. Flor. sulph. gr. xv. Theriac. Andromach. gr. x. Conserv. flor. lavendul. gr. xx. Victum quoque lacteum jussi cum pulvere e testis contritis. Notandum est, rejecisse illam cum lacte oleoso sanguinem concretum; unde valde sublevata est. Diebus quinto et sexto, molestiarum nihil; concreti vero sanguinis haud parum dejecit, adjuvante medicamento aperiente. Die septimo, ad libram sanguinis floridi denuo refudit. Iterum lacte oleoso usa est, multo cum fructu. Quum a pulvere testaceo lacte temperato abhorreret stomachus, adjura se recepit, et convaluit.

CARCINOMA five CANCER.

CANCER exulceratus, ob summum cruciatum, foedum odorem, et necessitatem morbum alendi, cujus unquam sanandi spei nihil est, tantum habet terrorem, ut de efficaci remedio exquirendo studiosissime meditari debeat benevolus quisque.

Ubi nullum ulcus accessit, lancinantes autem quos vocant dolores sentiri coeperunt, morbum saepius dissipavi cicuta intus data, vel extrinsecus adhibita. Cicutam utendam esse censeo in omnibus ejusmodi casibus, uti moris est Germanorum.

Impositum medicamentum Plunkettianum (ex arsenico id esse reor) mederi vidi, quum ulceris diametros non nisi digitum pollicem haberet, neque scirrhus se latius diffudisset. Vidi quoque ex interno ejusdem usu pessima nasci symptomata. Quin imo fide testis locupletissimi certo scio,

D

majori

majori id impositum superficiei, quam cujus mentionem fecimus, tanquam toxicum occidisse.

Ulcera cacoëthica, quæ in nosocomiis pro carcinomatosis habita fuerant, haud raro cedere novi idoneis medicamentis immutantibus, vel aptæ victus rationi.

C I R C I N U S.

FACILE discernitur circinus ab alio quovis cutis vitio. Ejus hæ sunt notæ. Partem alteram colli, vel thoracis, vel hypochondriorum, vel abdominis, in cinguli modum occupat, exanthemata habens aquosa, pustulis his similia, quæ confluenti potissimum variolarum generi propriæ sunt. Biduo ab eruptione turgescunt hæc exanthemata rubro, cyaneo, vel purpureo ichore. Magna adest inflammatio, ingens itidem dolor, cum angore quodam, animique victi atque oppressi sensu, quam putrida sit illorum indoles liquido manifestante.

In

In morbi hujus remedium, præclaros novi medicos iteratam præcipere sanguinis missionem, victum parcissimum, diaphoretica, &c. atque ea ipsa per plures dies continuari. At talem frustra consumi operam usus evincit. Serpit enim usque circa corpus malum, eo plus ægrotanti formidinis incutiens, quo magis apud vulgus inveteravit opinio, statim circinum interimere, simul ut orbem suum confecerit.

Efficacissime sanat corticis Peruviani drachma una, ex vino rubro Lusitanico, vel vetere Rhenano, quater quinquiesve in die sumpta.

Si vitiis istis, quæ summa corpora deturpant, majorem medici curam vellent impendere, certius illi multo de humorum statu judicium ferrent.

C O L I C A.

JAM ab adolescentia opportunior eram ventriculi et intestinorum inflationi. Quæ mea valetudo postea in pejus vertit

ex eo quod sequutus sum vitæ genere ; unde nimirum cælo nocturno expositus eram, imbrisque sæpissime membra madefactus. Neque hercle ad sanitatem conferebat, quod de idoneo interea corporis vestitu parum essem sollicitus.

Abhinc annis triginta septem, mense Januario, a frigore inter equitandum suscepto, invaserunt dolor ac distensio intestinorum ; præcipua morbi sede ad coli valvulam se habente. Sublatum quidem est id malum, haud tamen levi momento, rhabarbari tincturis, infuso florum chamæmeli, oleo ejusdem essentiali quod dicitur cum saccharo contrito, et injectis clysmatis spiritum pellentibus. At Februario insequente, iisdem manentibus causis, eadem repetebat ægritudo ; nullo ab iis quæ supra posita sunt impetrato auxilio, nec a jalappa, neque ab opiatibus. Immisso tandem enemate fortiori ex vino antimoniali, sale marino, infuso florum chamæmeli, et oleo e lini semine, iterum convalui. Vix vero
tertius

tertius præterierat mensis, quum graves ingruerent spasmi una cum intoleranda tensione; unde abdomen perinde ac si fistibus cæsum relinqueretur, ut summis digitis per aliquot dies sine dolore nequiret attingi.

Quum Augustæ Taurinorum peregrinarer anno M,DCC,L, et nocte concubia aggrediretur vetus illa pernicies, pilularum massam, quam in aliud concinnaveram, casu in cubiculo fortitus, eandem experiri volui, siquidem nulla aliunde erat in præsentî adlevationis spes. Hujus massæ grana quindecim devoravi, et horæ circiter unius spatio exoptata omnia inveni, cruciamenta ablegata, spiritumque liberius transmissum.

In Angliam post paulo reversus, quotiescunque a frigore admissio, seu a potu vel cibo alieno, minimas molestias exhiberet aut intestinorum inflatio, aut dolor ad coli valvulam, ad idem confugiens remedium, illico redintegratus sum.

Quid præstiterit hæc medicina sub titulo
Pilularum

Pilularum Stomachicarum [*The Stomach Pills*] magis innotescit, quam ut novo repertoris præconio indigeat. Europa, et utraque India, singulares earum virtutes jam diu testantur.

Compositio tamen ipsa, quantumcunque utilis, nonnihil deficit. Nimum enim calorem sæpe ciet, et nonnunquam incipientibus hæmorrhoidibus locum præbet; adeo ut pluribus in casibus, quibus alioquin subveniat, novi aliquid suboriatur mali. Longior forsan dies, majorque pharmacorum virium notitia, hæc incommoda antevertere docebunt.

Gaudete interim, quotquot estis benevoli, tandem aliquando compertam esse pilularum formulam, quarum ope non exsomnes tantum, nervosisque pathematibus affecti, dulci sopore detinentur; hypochondriaci, melancholici, ac maniacy reficiuntur; sed et qui Cereri et Baccho sacra intemperantius peregerint, torquentium vigiliarum requiem placidissimam inveniunt.

Stultæ

Stultæ credulitati utcunque fraudem faciant ignorantia et impudentia, pestem nefarie corpori inferentes, dum nihil nisi sanitatem præ se ferunt; ausim tamen sperare, neutram mihi harum vitio versum iri, ex eo quia pilulas ita commendo quarum auxilio non ipse solum crebro levatus sum, sed et proximi amicorum, et intimi familiares, et alii cujusque ordinis quamplurimi, a colico dolore sæpenumero revaluerunt.

DYSENTERIA.

SUB exitum anni M,DCC,L, plures e militibus tertiæ cohortis prætorianæ, in arce Londinensi præsidium agentibus, occupavit dysenteria endemia. Tentata sunt, qua vulgo exhibentur portione, radix ipecacoanhæ, vomitoria alia, rhabarbarum, &c. quæ, parca adeo manu exhibita, falsum me iterum atque iterum habuerunt.

Idcirco

Idcirco bis die præbui, ex cochleari spiritus vini Gallici, a decem ipecacoanhæ granis ad quindecim, prout ferebat ægri stomachus vel languidior vel valentior : Et hinc quidem morbus celeriter solutus est. Medicamentum hoc sumpserunt Craddock et Pigler, in lectulo cubantes, capitibus cervicali quasi defixis; quo factum est, ut tanta licet potione vix vomitus eliceretur.

In vulgari dysenteria inflammatoria, credo equidem, tria vel quatuor ipecacoanhæ grana, totidem rhabarbari granis admista, si bis vel ter die ex exigua aqua menthæ fumantur, plus profutura, post commodas evacuationes, quam alia ulla medicina, cujus aut ipse periculum feci, aut alii laudes cecinere.

Quod ad choleram pertinet, vomitum ac ventris fluorem frequentissime compesci vidi, præsertim in grandævīs, solo spiritu vini deflagrato; idque ceteris quibuslibet rebus nihil valentibus.

Magna adversus diarrhœam putridam
acidorum

acidorum vis est cum opiatīs conjunctorum; quod ipsum confirmat magnificus Störck, Ann. Med. Prim. p. 74.

Femina quædam Ward quadragenaria, apud Bringhurst in agro Leicestriensi ætatem degens, alvi sat molestum per sex menses passa fluxum, demum convaluit haustis tribus aut quatuor aquæ e vicino fonte Nevillensi congiis, ad methodum a Thoma Short monstratam in sua Aquarum Mineralium Historia. Neque rhabbaro, neque adstringentibus, obtemperaverat morbus.

FEBRES INTERMITTENTES.

IN omni febrium intermittantium genere haud raro cernitur, locis præsertim demissis paludosisque, corticem Peruvianum, quam scitissime etiam adhibitum, ex animi tamen sententia non succedere.

Istud sæpius mihi contigit observare, quum in agro Rutlandiensi versarer apud

E

fratrem

fratrem olim dilectissimum ; de quo verioratio, amorque fraternus, prædicare cogunt, et summo eum ingenii acumine fuisse præditum, et vitæ integerrimum, et artis mendi peritum, quo alium quemquam vix noverim peritiorem.

Dum in medicas inquisitiones una simul operam daremus, incidit forte in manus liber quidam, paucis notus, et paucioribus lectus, qui inscribitur Pharmacologia Anti-Empirica ; titulo is Latino, at vernaculo sermone conscriptus a medico sagaci Gualtero Harris. Refert ille, se in intermittentibus universis, quotiescunque cortex voto non respondisset, tali feliciter usum esse pulvere, qualis est pulvis Cornachini ; post deinde dato haustu Deckerfiano. Idem mox ipsi aggressi maximum operæ pretium brevi cepimus. Ex eo adeo tempore ad hodiernum usque diem, annos quatuor et triginta, eandem servare methodum in multis casibus obstinatis assidue persto ;
tamque

tamque insigni cum felicitate, ut vix hebdomas prætereat, quibus anni tempestatibus ejusmodi dominantur febres, quin unum et alterum hac sola insistens via ad sanitatem reducam.

“ Et tertianas abegi,” ait scriptor,* “ et quartanas, medicamento purgante ac portione quæ sequuntur; hisque interdum simplici tantum vice propinatis. Ignorari autem non oportet, permagni id interesse, quo protinus tempore eadem ministranda sint.

“ R. Antimon. diaphor.

Cryſtall. tart.

ſingulorum ſcrup. i.

Diagryd. gr. xii.

Croc. opt. pulv. gr. iii. vel iv.

Misce. F. pulvis, in cochleari vini albi, vel aquæ alicujus cardiacæ, v, vi, vel viii horis ante paroxyſmum exhibendus.

“ Eundem

* “ I have cured both tertians and quartans with
“ the following purge, and potion, and that some-
“ times upon the very first exhibition; only the cir-
“ cumſtance of timing it is of no ſmall moment.

“ R. Antimon. diaphor. &c. &c. ut ſupra.

“ Eundem fere pulverem præscriptum legas apud Margravium (nuncupatur is Pulvis Febrifugus egregius) quem in jure pulli gallinacei sumendum suadet auctor, duabus ante impetum interpositis horis. Ego vero mallet quinque, sex, aut octo intercedere horas ; eo nempe consilio, ut prius purgatio absolvatur, quam accessio accedat. Pulvis Comitissæ Varvicensis, seu Pulvis Cornachini, ejusdem prope est naturæ, atque ex iisdem ferme elementis compositus.

“ Huic tamen pulveri non unice confusus,
et

“ You may read much the same sort of powder in
“ Margrave’s *Materia Medica Contracta*, and called
“ Pulvis Febrifugus egregius, which he advises to
“ give two hours before the fit in chicken broth. But
“ I have rather chosen five, six, or eight hours,
“ before the time of the fit, that the purge might
“ just have finished its operation before the ex-
“ pectation of the paroxysm. The pulvis Comitissæ
“ Warwicensis, or Pulvis Cornachinus, are much of
“ the same nature, and ingredients,

“ But not trusting to this powder alone, and
“ con-

et mecum versans, quam opus sit cardiacum post tantam istiusmodi cathartici vim, tanto præsertim in paroxysmi cito adfecturi discrimine ; necesse ut plurimum duxi tale quid cardiacum, vel haustum febrifugum exhibere, quale reperire est inter notas ingeniosi Deckerfii in Praxin Barbettianam.

“ R. Aquæ card. benedict. unc. ii.
 theriacal. simpl. drachm. ii.
 Sal. absynth. drachm. semiss.
 Spir. sal. ammon. scrup. semiss.
 Syrup. papav. errat. drachm. iii.
 Misce. F. haustus.

“ Hunc

“ considering how requisite a cordial often is, after
 “ a purge of this strength, and especially at such a
 “ critical time as that of the paroxysm, so soon succeeding, I have generally thought it necessary to
 “ give some such cordial, or febrifugous draught, as
 “ is mentioned in the notes of the ingenious Deckers
 “ upon Barbette’s Practice.

“ R. Aq. card. benedict. &c. &c. ut supra.”

“ This

“ Hunc itaque porrigo, certe haud abfimilem, haustum, circa tempus accessionis, aut ante eam unius fere horæ spatio. Neque memini, me, curatione hac adeo in proclivi vernas tertianas ac duplices tertianas profligare cupientem, eas non profligasse. Enimvero raro fallat in intermittentibus autumnalibus, modo bis terve repetatur.” Haftenus vir sagax Harrifius.

Ad illa et hoc accedat, me medicinam hanc sanare novisse, etiam quum non purgaverit; me quoque semper præcipere, ut multa veste opertus paroxysmum in lectulo opperiatur æger, haustu Deckerfiano, antequam

“ This, or some such draught, I do use to give
 “ about the time of the fit, or an hour before. And
 “ I cannot remember, that I have once failed to cure
 “ the vernal tertians, and double tertians, by this
 “ easy method. And it is but seldom that it will
 “ fail in the autumnal, especially if repeated two or
 “ three times.” Pharmac. Anti-Empir. p. 176.

tequam redeat horror, nequaquam prætermisso, tametsi per alvum nulla facta fuerit evacuatio.

Elizabetha Freeston, in Great Ayston, annum agens decimum sextum, in quartanam incidit anno M,DCC,XLVII. Phrenitis eam in autumno occupaverat; quartana autemprehendit eo qui sequutus est Novembri. Pulverem sumpsit Cornachini, alvo præter solitum nihil reddente. At tamen per hebdomadas sex morbo vacabat: quibus exeuntibus reversa est febris. Post administratum diu et incassum corticem Peruvianum, idem est repetitus Cornachini pulvis cum haustu Deckerfiano; qua curatione febris in exilium acta est. Exanthemata quædam, cicatricularum instar e variolis, per totam faciem prorumpebant, manebantque. Virgo vero usa est secunda valetudine.

Famulus viri cujusdam reverendi Gueft, apud Seaton, pulvere Peruviano inutiliter cum theriaca per sex menses adsumpto,
pulveris

pulveris usu Cornachini in totum restitutus est, mense Augusto M,DCC,XLVI. Nec ventriculum, nec alvum, quam minime moverat pulvis; sed officio suo specificæ, quod dicitur, satisfaciebat. Dire vexatus fuerat hic æger.

Vere possum adfirmare, post centena plus pericula, maxime ubi cortex Peruvianus parum valuerit, successum hujusce medendi rationis unicuique alii longe antecellere, cuicuiusmodi ea sit, undecunque petita, quacunque nitatur auctoritate.

Qui alia in huiusmodi valetudine medicamenta velit celebriora, is adeat Riverii antiquarium, Baglivium de sale ammoniaco crudo, et de floribus chamæmeli, Hoffmanni electarium, necnon Boërhavii antipyreticon raro fallens.

§

Præbui frequenter theriacam Andromachi, sicuti Galeno mos erat; adjecto succo limoniorum, vel semuncia haustus salini.

Vix

Vix ausim in medium proferre, quantopere me attonitum habuerit, post Sydenhami et Mortoni tantorum virorum testimonia, corticem videre sincerissimum Peruvianum, ex ipsorum præscripto adhibitum, plurimis meis ægris vix quidquam aut nihil prodesse. Quod sic moneo, ut tamen fatear, minime me fugere quam nobile sit antidotum hic cortex, cui confidere liceat in casibus aliquando tantum non deploratis. Cujus rei subjicio exemplum, adnotatu cumprimis dignum.

Menſe Auguſto calidiſſimo, Joannes Wright in vico Lidington agricola, quum octo et quadraginta annos compleſſet, febrem naſtus eſt quam nervoſam appellant, illic forte viciniæ epidemice graſſantem. Quæ in re tali fieri adſolent, omnia tentata ſunt, nec irritò conatu; tranſibat enim febris nervoſa in intermittentem tertiani generis, quæ per duas

tresve accessiones merito quidem ordinatis posset adnumerari. Deinde vero frigus acriter adeo invasit, ut horas minimum sex septem homo sine sensu ac motu, et gelu quasi rigens, jaceret, urina et stercore se inscio elabentibus. Post decessionem febris, subsidebat in urina paulum aliquid; affatimque is bibebat florum chamæmeli infusum, in quo soluta erant salis ammoniaci viginti grana. Horror, qui insequutus est, non minus tenuit triginta quatuor horis; quo toto spatio plane pro mortuo habitus foret, cynicus nisi, una cum sudore effusissimo, identidem intercessisset spasmus: quem tandem excepit sudorem sedimentum urinæ lateritium. Tunc sensus rediere. Semunicam corticis Peruviani extemplo dedi ex mistura cardiaca aromatica; qua epota, salvus evasit et incolumis, nullam postea passus recidivam. Haud forsitan abs re fuerit notare, variolas, confluentis potissimum

mun generis, jam ante quam ipse febricitare cœptus est, parvulos ejus liberos, numero decem, corripuisse.

§.

Donaldus Stewart, e decurionibus legionis Scoto-Britannæ de Drumlanrick, sub auspiciis Belgarum Fœderatorum militantis, febre tertiana, tempore autumnali anni M,DCC,L, graviter laborabat. Primum emetica, posthæc cortex Peruvianus exhibitus est; neutiquam inclinante morbo. Post tres menses, Londinum a decurione ventum est; ubi febris, ita uti novas ex nova cœli temperie consequuta vires, in dies ingravescebat, et, pluribus numeratis accessionibus, in quartanam desiit. Pulvis Cornachini nullum adtulit levamen; neque haustus Deckerfianus, vel tantillum, frigus minuebat. Quonam vertendum? Experientia magistra edoctus, illam institui hujusce miserrimi curationem, quæ, sancte possum adjurare, nunquam me

falsum habuerat, dum in Belgio Hispanico medicinam facerem, inter prætorianos sacræ majestatis Britannicæ anno M,DCC,XLVIII: i. e. Sanguine prius misso, nitrata in emulsione præbui, cumque his una sal ammoniacum specie e contrayerva commistum. Lenior inde insequens paroxysmus: minus erat frigoris, minus quoque caloris ac febris. Ex sanguinis autem inflammatione et visciditate indicia arripui venæ iterum secandæ, et in usu eorum, quæ supra scripta sunt, permanendi. Nec frustra fui; arguebat enim proximæ accessionis magnopere diminuta vis, recte ea non prætermisâ fuisse indicia. Imperavi, ut continuaretur usus emulsionis; neque post unquam rediit febris.

Hanc medendi rationem seni medico apud Eÿndhoven acceptam refero; qui, Baronis Van Swieten sub Boërhavio Hippocrate Batavo condiscipulus, mihi olim religiosissime adseveravit, lanceolam et nitrum,

in

in regionum illarum palustrum intermittentibus, singula perficere atque absolvere,

§.

Mulier quædam Austin, in Rockingham degens, quartana legitima per biennium erat conflictata; multis sine effectu devoratis medicamentorum potionibus. In hecticam morbus degeneravit. Ibi tum ad lac asininum se recipiens, cito convaleuit, pristinusque corporis habitus restitutus est.

§.

Ægros tres vel quatuor, quibus colicus dolor periodicus, cum febre, vomitu, et coccinei quasi coloris sedimento in urina, illico a cortice Peruviano adsumpto novi sanari; quum cetera omnia qualiacunque ne hilum quidem promovissent. Idem et animadverterat Fernellius.

FLUOR

FLUOR ALBUS.

HOC morbo detentas feminas biduo
vidi vel triduo liberari, immixtis in
vulvam Calomel. drachm. i, Aquæ calc.
unc. ii, Aquæ fontan. unc. iv, adjecta
gum. Arab. drachm. i. Id, inquam, vidi,
quum pessimi coloris humor proflueret;
intus ante omnibus, unde aliquid spe-
randum, inutiliter datis.

Purgantia et Mercurialia non semper
juvant. Ex usu semper cicuta et cortex
Peruvianus.

Mulier quædam Charity, quum esset
annorum triginta, eo usque in hoc malum
incurrerat, ut singulis quibusque viginti
quatuor horis tantum e naturalibus ex-
stillaret materiæ, quantum matellam im-
pleret. Ejus quoque rei ipsemet testis fui
oculatus. E tanto profluvio cibi appe-
tentia prorsus prostrata, viresque adtritæ
sunt.

sunt. Haustum e decocto florum roris marini, cum laudano, et succino præparato, singulis noctibus sumpsit; et mane quotidie per hebdomadem bolum devoravit, ex rhabarbaro, succino præparato, et stillatio florum chamæmeli oleo confectum. Tum deinde continuato usu electarii e visco querno cum albo crudo ex ovis, infusumque roris marini et millefolii per paucas hebdomadas potando, expedita est.

Plurimum profeci hujusce medicamenti ope; cujus si externa tantummodo spectetur facies, vix auguratus fueris in illo aliquid inesse boni.

Exitu nonnunquam prosperrimo in jentaculum imperavi cerevisiam Londinensem **Porter**, item cerevisiam generosam Brunsvicenssem, et cum modico panis cibarii frusto veterem provinciæ Cestrensis caseum, qui ceteris omnibus palmam facile præripit.

FLUXUS

FLUXUS MENSTRUUS.

MUlieri cuidam honestæ, in St. James's-place, a frigore suscepto suppressa sunt menstrua. Nunquam illa tali affectu antea laboraverat. Cachectica evasit. Variis, quibus sollicitaretur uterus, citra effectum administratis, aperto demum sub utroque genu fonticulo, simulque etiam in brachio sinistro, sublevata fuit. Etiamnum scaturiunt hi fonticulæ (Sept. M,DCC,LI) per trium annorum spatium; quo temporis tractu ad periodos solennes, et ubere satis copia, profluxit sanguis.

§.

Virgo quædam Rhodes, apud Drayton in Rutlandia, viginti annos nata, eodem fere die in menstruis esse cœpit, quo die secaretur vena saphena. Præter hanc sanguinis cunctantis deducendi methodum, alia nulla illi unquam profuerat.

Puellam

§.

Puellam trimulam quondam vidit frater meus, cui menses fluebant, perinde quasi jam pubesceret. Præproperæ huic fluxioni superfuit illa non ultra biennium.

HÆMORRHAGIA.

CUIdam Laſton, apud Duddington in comitatu Northamptonienſi, ſanguis fere quotidie per nares erupit. Eo nati omnes ſimiliter dolebant; filiaque ejus a majore proxima, eodem affectu extenuata, diem ſuum obiit. Hujusmodi raro dantur exempla.

— Hay, tertiæ cohortis prætorianæ tympaniſta, e quamvis levi plaga, ex ipſa proſecto aciculæ punctura, ſanguinem ita fundere ſolitus eſt, ut ſæpius periclitaretur vita. Styptica qualiacunque pro nihilo erant. Ultro ſemper ceſſavit profluvium. Quum leviter is quondam in muſculo gaſtrocnemio vulneraretur, tanta repente inceſſit hæmorrhagia, ut interſitiis

G

ubique

ubique musculorum se sanguis ingereret. Istam omnino refrænavi hæmorrhagiam, dilatando in novem usque digitos quod acceperat vulnus ; id optime consulentibus Davide Middleton, Cæsare Hawkins, Joanne Clephan, aliisque nosocomii Sancti Georgii chirurgis ac medicis.

Iteratæ potiones salis cathartici amari Epsomensis plus sanguini sistendo conferunt quam alia quævis laudatissima adstringentia. Hoc debeo viro præclaro Frederico Hoffman, omnibus, quibus cara salus humana, carissimo.

HÆMORRHOIDES.

TAntus est nonnunquam huic ægritudini dolor, tanta itidem inflammatio, tam valida denique pulsatio, ut vehementissima illinc oriantur febris symptomata, delirium scilicet, &c. ; nihil ad ea amolienda valentibus, vel fotu, vel sanguinis detractiōe, vel hirudinibus adfixis,

adfixis, vel cataplasmatibus, vel leni purgatione, vel etiam prona corporis positura. Sub quibus casibus, nulla apostematis futuri ratione habita, venas hæmorrhoidales latius aperio. Qui extrahitur sanguis, fere est concretus. Semel tantum mihi contigit emittere rubicundum.

Medicinam hanc expertus in amico quodam quadragenario, in altero sexagenario, in juvene viginti annorum, in centurione triginta sex annos habente, necnon et in alio inprimis dilectissimo, præsentaneum omnibus remedium inveni; nec eorum quisquam valetudinis passus est recursum. Coaluerunt aperturæ intra diem octavum aut decimum.

Persuasum habeo, plurimas sic posse fistulas præcaveri, si tempestive satis in eam curam incumberent medentes. Melius certe res verterit, modo ne demittatur specillum in vulnus, neu penicillo aliquo idem impleatur.

HYDROPS.

MILES tertiæ cohortis prætorianæ, nomine Sims, ex febre intermittente autumnali in hydropem deciderat anno M,DCC,LIX. Gravabant pariter leucophlegmatia et ascites. Pulverem, cujus subjicitur confectio, exhibui, unde largus est elicited sudor; eodemque intra triduum ter repetito, is exinanitus est. Ut vero quam maturrime gangrenæ occurreretur, cujus jam signa in cruribus manifesta nimis se ostendebant, necesse judicavi corticem Peruvianum cum vino interdum administrare; vespere autem pulverem præstare, ne aqua renascente suffocaretur. Interjecto tempore, reversa est febris, in quotidianæ formam mutata; cruribus quidem sub noctem tumentibus, at nulla alia remanente hydropis nota. Per quatuor con-

tinuos

tinuos dies dedi mane semunciam cremoris tartari; quæ, iusto vehementius purgans, copiosam citabat diuresin. Suapte sponte febris evanuit; et regimine roborante redintegratus est æger. Sequitur formula pulveris;

℞. Pulv. scillæ arid. a gr. x ad xv.

Piper. nigr.

Sal. nitr.

singulorum gr. x.

Pulv. rad. ipecacoan. gr. v.

Op. pur. gr. ii. vel duo cum semiss.

Cum syrup. althææ, vel melle, formentur in pilulas, quæ habeant singulæ quinque grana, h. f. in lecto sumend. ex cochleari aquæ menthæ, vel spiritus vini Gallici.

Nimia est sæpenumero hæc proportio; ut quæ tormina pluribus arcessat, et validius purget. Sin autem cutis renesve medicinam sentiunt, facili ea negotio in stomacho retinetur. Pulvis utrumne diureticus nuncupandus sit, an diaphoreticus, plane nequeo statuere; quum non satis constet

constet per urinam plus polleat, an per sudorem. Circa effectus, quam proxime accedit ad pulverem sudorificum celebris nuper empirici Joannis Ward.

Miles alter ejusdem cohortis, ex his qui apud nostrates **Grenadiers** nominantur, leucophlegmatia per universum corpus tenebatur. Nulla præcefferat febris intermittens. Paucissima huic urina; impeditiissima respiratio. A supra dicto bis sumpto pulvere, totus undique sudore diffluebat, et urinam trium sextariorum mensura quotidie reddebat, usque donec siccatus fuerit. Viribus hoc pacto fractis, ad vicum Hampstead amandatus, ocius convaluit.

Eodem pulvere restrictius exhibito, et hydropem abdominis, et anasarcam, aliquoties sustuli.

§.

Bis sequenti medicamento aquam in hydropem ascite evocavi, viginti quatuor horarum spatio. Brevis ea fane molestia inter-

intercapedo; mox enim redundante humore periit vis medicamenti.

R. Gum. ammon. drachm. i. solut. in aqua puleg.
unc. v.

Oxymel. scillitic. drachm. cum semiss.

Sal. ammon. crud. drachm. cum semiss.
nitr. drachm. i.

Misce. Sumat cochlearia duo quarta quaque hora.

§.

Puer quidam Delaval, annorum fere novem, ascite liberatus est pilulis sequentibus, superbibendo animæ rhabarbari cochlearium. Vide Wedelii Amœnitates Materiæ Medicæ; opus nocturna diurna manu versandum ab omnibus materiæ medicæ vere amantibus.

R. Pulv. gum. myrrh.
ammon.

singulorum scrup. ii.

Extract. flor. chamæmel. drachm. i.

Ol. still. flor. chamæmel. gutt. x.

Elix. alo. q. s.

F. pilulæ, quæ habeant singulæ quinque grana.
Sumantur tres bis die.

Pessime

Pessime habuerat hic puerulus per sex menses; aliaque ex alia methodus, qua in integrum restitueretur, frustra erat tentata. Jussi ut equo quotidie, quum per cœlum liceret, veheretur. Octantem quoque cerevisiæ Londinensis, cum vetusto provinciæ Cestrensis caseo, panisque cibarii frusto, in cœnam concessi.

§.

Contra asciten, siue adest leucophlegmatia, siue non adest, efficacius præstat auxilium compositio sequens quam alia ulla mihi hucusque aut nota aut excogitata;

R. Cremor. tart. drachm. vi.

Pulv. rad. rhabarb.

Spec. aromat.

singulorum drachm. i.

Oxymel. scillitic. q. s.

F. confectio tenuior; cujus sumatur cochleare parvulum ter quaterve intra viginti quatuor horas, ita ut alvus ad tres vel quatuor vices soluta respondeat.

Gulielmus

Gulielmus Thomson in Leicester-square
 ascite cruribusque tumefactis ægrotabat.
 Multa per integras tres hebdomadas ex-
 pertus sum remedia; nullo fructu. Ac-
 citus est Joannes Ward: cujus pulvis su-
 dorificus quum neque sudori neque urinæ
 promovendæ quidquam conferret, idem
 ille pilula sua purgationem instituit. Ne-
 que id felicius. Deinde dedit e guttis
 quas diureticas nuncupavit; quæ, quan-
 tum ex gustu conjectare licuit, nihil aliud
 mihi visæ sunt quam lixivium vulgare,
 cui, populum concinnius fallendi gratia,
 color arte immutatus fuerat. Harum de-
 cem, quindecim, viginti, quadraginta,
 etiam ad octoginta, diei unius spatio in
 herbarum infusione sorbebantur, citra ulla
 etiamnum sanitatis redituræ signa. Ex-
 eunte tandem tertia hebdomade, res in
 melius mutata. Urinæ plus plusque in
 dies profluxit; in pristinumque restitutus

est æger diebus circiter quatuordecim, ex quo primum occepisset diuresis. Prospera duobus tribusve annis usus valetudine, morbo demum acuto ruri correptus, quod naturæ debuerat persolvit. Accepi, perisse illum jecinoris inflammatione.

Ex illo tempore adhibui eodem plane modo lixivium tartari, vel lixivium saponarium, adjecta elixiris aloes, vel extracti rhabarbari aut chamæmeli, octava parte, pluribus in casibus, ubi crura fuerint intenta, ac venter ita intumuisse, ut, si leviter manu pulsaretur, mota intus aqua facile sentiri posset; copiosamque inde diuresin citando multos explicui.

Joannes Ward guttis diureticis sæpe usus est in hydrope, exitu secundo. Nunquam mihi evenit, nisi in casu supra posito, earum rationem cognoscere.

Multa sunt hydropis exempla cum facie decolore ineuntis. Ibi parata ex rhabarbaro cum salibus alkalinis ac diureticis
quam

quam citissime sanant; maximeque si ex fortioribus amararum radicum, herbarum, et florum infusis, administrentur.

§.

Militem tertiæ cohortis prætorianæ ex hydrope pectoris ad salutem reduxi, tribus aridæ scillæ et decem rhabarbari granis, cum scrupulo theriacæ Andromachi, in bolum coactis, perque decem aut duodecim continuas noctes hora somni devoratis. Hinc mota est potenter urina.

Cavendum erit, ne temere hic morbus cum asthma confundatur. Diagnostica apud Baglivium invenias.

Quinque talium hydropicorum, quos omnes ad signa Bagliviana nutrieram, aperui cadavera. In singulorum thorace frequens est repertus humor. Quæritur, an istiusmodi in casibus e cavo pectoris emitti oporteat aqua. Lingua, ab extima parte ad imas usque radices, fere nigra est, vel cum livore quodam rubicunda. Adsunt

insuper strangulationis signa minime temnenda.

Paracentesin bis feci in pectore, praesentibus anatomicorum principe Gulielmo Hunter et aliis. E laborantium uno ingens prodiit materiae purulentae vis; ex altero genus quoddam feri viscidum. Uterque supervixit operationi sex hebdomadas; sed fato demum functi sunt, plus passi ex aere frigido ingrediente ac regrediente, quam vel a febre, vel a statu depresso. Cui, serum emiseram viscidum, illi viginti quatuor horarum spatio conciderunt venae a centum triginta pulsibus ad septuaginta, vel infra, ibique ad vitae metam perstiterunt.

§.

Equiso quidam Thorpe, quinquagenarius, poculis largioribus indulgendo hydropicus juxta et asthmaticus evasit. Hisce malis per complures menses colluctatus est; facie livida, cibi cupiditate prorsus nulla.

nulla. Autumnum versus mirum in modum turgescebat. Cruribus oborta sunt ulcuscula, tanto cum pruritu, ut nunquam non scabendo non posset temperare. Hinc plurimus effluxit ichor, qui summos etiam calceos exsuperavit. Tum evanuerunt singula morbi symptomata; incessit rabies edendi; salusque amissa brevi recuperata est.

§.

E fide dignissimis comperto, in India Orientali speciem esse hydropis, quæ illito unguento mercuriali concedit; in animum induxi, idem hic fortasse terrarum fieri posse. Expertus sum in milite; expertus in remige. Neque huic, neque illi, minima erat plagæ venereæ vel præsentis, vel præteritæ, nota. Fefellit utrobique consilium. Cessit ex sententia in milite alio Fullingham, cui jussi perungi femora; at venus illi immunda morbum conciliaverat.

Hy-

Hydropis species quædam est, cui obnoxius uterque sexus circa annum ætatis quadragessimum vel quinquagesimum, quæque fugari potest non nisi sanguine detracto, victu tenui, medicamentisque antiphlogisticis. Multos vidi hoc genere affectos. Quum, ad celerius subveniendum, sanguinis missionem hortatus sum, me mirati fere sunt adstantes tanquam rem inimicam præcipientem. Sed id commodè respondere experimenta plura testantur. Inter paucos qui hujus curationis meminerunt scriptores, eminet Thomas Lawrence, cujus elegans volvatur Disputatio Medica de Hydrope.

I N S A N I A.

IN hac mentis nostræ atque rationis tam lugenda ruina, primus omnium (quantum scio) Fredericus Muzellius tartari solubilis usum scriptis commendavit.

Hujus tartari beneficio, ad auctoris præceptum exhibiti, tres tertiæ cohortis prætorianæ milites ad sanitatem revocati sunt. Priori supervenerat insania, a frigore post illitum liberalius mercurium admissio; alteri, a gravibus commilitonis cujusdam ictibus, et accepta contumelia. Qua de causa insanire crederetur tertius, nescitur. Singuli furebant, canebant, diras fundebant, &c. sine febre.

§.

Ante editas Muzellii observationes, homo quidam e dica diutius tracta in maniam

niam actus, sanatus erat a Gulielmo Battie, largis datis tartari regenerati vel salis diuretici potionibus, interpositis quotidie ex intervallo potionibus eorundem parvis. Adhuc tractatum ejus ingeniosissimum.

Ab eodem vidi quoque mulierem honestam simili modo sanari, addito gummi sagapeno, &c.

Et aliam quoque contigit cernere ab eodem restitui, ejusdem salis ope, et solutione gummi ammoniaci cochleatim subinde exhibita. Ex traduce erat hæc infania, et decurso biennio rediit, sed levius.

Præter eos quos memoravi, vidi ad triginta alios eadem medicina ad sanam omnino mentem reduci.

Talium fere medicamentorum usu, in melancholia et mania pellenda, vir ille, arte sua insignis, cum maxima fama maximas opes conquistavit.

Interfui

Interfui quondam, ubi mulier, a partu infaniens, decocto corticis Peruviani et vino compos sui facta est.

Præsens quoque vidi, quum infania, quæ febrem autumnalem irregularem exceperat, eodem cortice solo ex toto tolleretur. Vide quæ super re tali scripta reliquit optimus Sydenhamus.

LACTIS UTILITAS.

GEorgius Burton Uppinghamiensis, annos circiter duodecim natus, pro ætate habitior, et, nisi quod negotium eī lumbrici nonnunquam facefferent, bona satis fruens valetudine, acuta calebat febre, cum pulsante quodam circa scapulas dolore. Mansit per tres hebdomadas illud symptoma; quibus elapsis, invasit surditas. Sudores quoque nocturni sic premebant, ut tanquam colliquefactus adolescentulus

I

jaceret.

jaceret. Medicamenta imperata sunt perquam idonea ; quæ tamen ut sumeret, illi nullo modo persuaderi potuit. Hortante fratre meo, e vicinia quæsitæ est quæ lactabat nutricula. Isthæc, mammam distentam præbendo, omnem medici opem brevi supervacaneam reddidit.

Aliud lactis utilitatis exemplum supra invenias, p. 37.

L I P P I T U D O.

FUMO tabaci ducto depulsa primum est, idque celerrime, lippitudo juvenis Uppinghamiensis Hill. Ab illo tempore, si per pauculos etiam dies is tubulo parum diligenter operatus erat, continuo lippiebat. Rursus arrepto tubulo, quum primum ex fumo ducto sputum edi incepisset, certo is facile et mature revaluit.

L U E S

LUES VENEREA.

VARIIS signis cognoscitur nefanda hæc lupanarium propago: E cancris in glande, in præputio, et nonnunquam ad ipsas radices penis; e bubonibus; e tonsillarum, aut palati, eique junctarum partium, exulceratione; e pustulis per corpus fufis, imprimis ex iis quæ in fronte emicant, vel ad loca corporis maxime pilosa; e doloribus nocturnis, supraque ossa et circa articulos tuberculis duris; ex verrucis in glande vel præputio; e rhagadibus ad anum; ex ossibus palati aut nasi putrescentibus; ex ipsius denique calvariæ, nec raro tibiæ, ossiumve cæterorum, carie.

Hoc symptomatum tam terrificum agmen facillime in fugam vertitur, nulla sui colligendi facultate data, si singulis nocti-

bus duo unguenti mercurialis scrupuli feminibus per semihoram ante focum illinantur. Id autem ita fieri debebit, ut a pudendis et inguinibus, præcipue ubi jam adfunt ulcera vel bubones, omnimodo abstineatur. Quamdiu non ulla exulceratione læduntur gingivæ, sedulo infricare perstandum est, donicum a viginti ad quadraginta drachmas absumptæ fuerint. Sub primis quindecim inunctionibus drachma corticis Peruviani quotidie devoranda est, cum oleribus abunde, aurantiis, aliisve tempestatis locive fructibus ; at vero alteris quindecim inunctionibus in dies bibatur sextarius decocti farsaparillæ, qui sextarius ternas habeat ejus radicis uncias. Quum salivæ per argentum vivum proritatio non omnino sit necessaria, eam sæpius effugere licet per diætam modo propositam, per crebro mutatum aerem vel loca, vinique interioris notæ usu moderato.

Hæc

Hæc breviter dicta sunt, quæ uberius et fufius in eo libello differuntur, quem olim lingua vernacula de morbo hoc perniciosiffimo feperatim feci. Ad illud volumen, fi quid hic deeffe videtur, lectorem delego.

LUMBRICI.

ANNO M,DCC,XLIII, mulier quædam Sharmont, Uppinghamiæ degens, quarto poft puerperium die faviffimis correpta eft vomitionibus. Immodicus his fupervenit lochiorum fluxus. Hinc tanta virium jactura, pulfusque adeo celer, exilis, atque inæqualis, ut in fupremo discrimine conftitueretur ægra. Septimo die lumbricum illa teretem rejecit, aliosque duos poft paulo demifit. (Quinque pulveris ftanni Cornubiensis drachmæ ex theriaca propinatæ funt, eo quem poftuit modo jam ante laudatus (p. 7.) magifter

gister meus Carolus Alston. Prima hac exhibitione fræni vomitionibus injecti sunt, ad earum coercionem inutilibus antea tam opiatibus quam anti-emeticis. Duabus omnino pulveris ejusdem consumptis unciis, vomere desitum est; eodemque temporis momento coercitus quoque est lochiorum fluxus.

Mulierem aliam White, apud Wing Rutlandiæ vicum, quum quartum jam mensem ventrem ferret, ciborum quos ceperat omnium vomitus infestabat. Sanguis iterum iterumque missus, purgantia, anti-emetica cujusque generis, acida, quæque iis contraria sunt, eam nihil juvabant, nisi quod linguæ bubulæ infumatæ exiguum quiddam a stomacho quandoque retineri posset. Hoc modo tribus se habuit hebdomadis. Incidit tandem suspicio lumbricis eam exerceri; ideoque pulvis stanni Cornubiensis exhibitus est. Cujus post devoratam non amplius semunciam, ad salutem

salutem pervenit; et, actis demum mensibus, onus suum maturum, perscitum puerum, in gremium læti patris effudit.

MORBILLI.

ENIXA est quædam Skellion die Martii decimo octavo M,DCC,XLVII; nec ibant lochia. Sexto a partu die ostenderunt se morbilli, cum symptomatis præter solitum vehementibus in illa aeris constitutione. Spiritus difficultas ad strangulationem fere. Extractus est e brachio sanguis; unde mirum in modum huic symptomati occursum est. Septimo a partu die (secundo vero ab eruptione) morbilli penitus evanuerunt, nec denuo redierunt. Nono die integritas. Decimo quarto res secus cessere: et dolebat caput, et spiritus iterum urgebat. Venam saphenam ad uncias quinque fluere feci. Hinc omnia delinita; at lochia adhuc restricta.

Postridie

Postridie sale cathartico amaro et rhabarbaro purgatum est. Inter purgandum, feruntur debito more lochia; et omni malo mulier feliciter expedita est.

§.

Ex eo quod ægrotantibus e variolis auræ liberioris usus prosperrime vertit, opinati sunt haud pauci, et eos quoque, qui morbillis laborant, recte, dum prodeunt maculæ, sub dio versari. Falluntur hi valde. Id enim gravius multo periculum efficit: immo vero mihi videtur mortem sæpius intulisse. Etiam quum hoc curandi genere utentibus maxime feliciter res cesserit, iteratæ sanguinis detractiones, regimenque asperrimum antiphlogisticum pluribus mensibus continuatum, ægros male mulctatos ab interitu vix vindicant. Contra ea, ego semper commoneo, ut in lectulo se contineant qui mihi traditi sunt; hisque singula interdico, quibus impediri minimum queat macularum eruptio.

P A R O-

PARONYCHIA.

A Secto nimis introrsum ungue, vel clavo pedis, ortam paronychiam nunquam vidi, nisi aliquo intus in sanguine substante vitio. Neque unquam impositum aliquid ex iis quæ digerunt, vel ficcant, prodesse novi, ante iterum tertioque factam purgationem. Hinc subitanea fere semper ac melior rerum inducitur facies. Ubi semel inflammatio sublata est, si curiose satis excisus fuerit unguis, adhibitum linum, balsami traumatici gutta imbutum, binis ternisve diebus prorsus medebitur. At si dolor inde concitetur, vel nova succrescat inflammatio, tum demum usurpanda sunt digerentia, locusque calidis curationibus tantisper fovendus, dum balsami vim ficcantem ferendo par sit. Quo facto, mo-

K

mento

mento quasi horæ, finitur malum. Pulvis jalappæ cum alterantibus ex mercurio, vel iis nullis, humores præ omnibus corrigit ac purgat.

PULPA COLOCYNTHIDIS.

FEMINA quædam Systmey, apud Beesbrooke Rutlandiæ vicum, annos nata duo et viginti, hausto pulpæ colocynthidis ex cerevisia infuso, verminata et purgata est vehementissime. Ad annum quinquagesimum tertium provecta, dolore adhuc intestinorum, necnon assidua in regione umbilicali pulsatione, eo usque torquebatur, ut prostrato in ventrem corpore cubare ac dormire necesse haberet. Anno ætatis tricesimo octavo, semper quum menstrua ferrentur, quæ justis sane temporibus, at exigua copia redibant, magnam vim sanguinis ore reddiderat ;
pau-

paucisque post diebus, cruenta, concreta, graveolentia rejecit. Ab anno quadragésimo octavo ad quinquagesimum secundum menstrua rite provenerunt. E carniū genere stomachus nihil retinere potuit. Has quidem comeſtas dolores intolerandi ac vomitiones ſequutæ ſunt. Cibi calidi, aromata, et acida, inprimis offendeſbant. Pergrata jura pingua, victus lacteus, ac butyrum. A medicamenti auxilii nihil. Graviffimas denique de pulpa colocynthidis querelas continui dolores continenter eliciebant.

R H A B A R B A R U M.

NULLUS dubito, quin parata ex rhabarbaro, ni ſero nimis uſurpentur, cunctas fere infantum, æque ut ipſum ſimplici forma rhabarbarum, febres heceticas ſanaverint, ſive venter diſtenſus eſt,

sive non. Inter notiora in hunc finem comparata pharmaca nihil prius habeo quam animam rhabarbari Wedelii. Felicius tamen rem gero pulvere antihectico, cujus formulam videre est ad calcem Inquisitionis Novæ de Febribus, quam paucis retro annis vernaculo sermone conscriptam in lucem edidi.

§.

Miles tertiæ cohortis prætorianæ e febre, ut videbatur, inflammatoria, in quartanam decidit. Quartana vicissim in hydropem abdominis et crurum degeneravit. Continuato in decimum diem medicamenti sequentis usu liberatus est;

R. Pulv. rhabarb.

Sal. tartar.

singulorum scrup. ii.

Infus. flor. chamæmel. unc. iii.

Misce. Sumat jejunus mane.

Idem

Idem pauperculæ cuidam prope Queen's-square, Westminster, supervenerat morbus a fluxu lochiorum immodico post partum difficilem ; eodemque modo sanitas restituta est, nisi quod illa ex infuso herbæ marrubii albi, miles autem ex infuso florum chamæmelinorum, medicamentum sorpserat.

Pari ratione sanavi militem senem exauctoratum, cujus valde distensus erat venter. Adficiebatur is ictero ; at nullus aquæ motus a digito contrectantis percipi potuit.

§.

Filio quinquenni tympanotribæ principis tertiæ cohortis prætorianæ intumuerat venter. Aderat et febris hæctica, qua acerbissime acceptus fuerat per multos menses. E vestigio convaluit, hausta Sydenhami rhabarbari ex cerevisia tenui infusione. Cerevisiæ tenui prætulerim vinum album aquæ admistum, quippe tardius

dius acescens, magisque stomacho gratum ac benignum.

§.

Mulieri Pridmore, apud Morcott Rutlandiæ vicum, annos habenti viginti octo, ex partu difficili, retentaque per biduum placenta, nimius erat lochiorum fluxus. Huc accedebat cachexia cum febre. Uroscopi monitu corticem Peruvianum liberalius devoravit. Alvi supervenit profluvium, itemque abdomen tumefactum; unde vires adeo imminutæ, ut e lecto surgendi facultas non daretur. Invenit eam frater meus et hydrope et ventris fluore laborantem. Jussit viginti quinque rhabarbari grana, cum oleo cinnamomi et menthæ in bolum coacta, altero quoque mane devorari, vespere autem opiatum ex aqua cinnamomi exhiberi. Sub finem tertiæ hebdomadis, omnia in tuto posita sunt. Ad vires collapsas refarciendas vinum datum est diureticum, cum pilulis elimatura

limatura ferri non rubiginosi, simul et amarorum extractis. Insignis qui torquebat in intestinis dolor ex toto sublatus est usu balsami Peruviani, saccharo, sicut præcipit Sydenhamus, albidissimo instillati.

R H E U M A T I S M U S.

E Nimio cæli ipsius humore, e dapibus lautioribus, ex cerevisiarum spissitudine, et incuria de amictu plane singulari, incolæ meridionalium hujusce insulæ partium rheumatismo super alios obnoxii sunt. Qui rheumatismus aliam atque aliam postulat curationem, pro statu corporis, quum morbus id primum prehenderit.

In genere inflammatorio, cui febris adest cum arteriarum pulsu duro atque æquali, ubi dempto sanguini coriaceum est crassamentum, assiduisque doloribus
vexatur

vexatur totum corpus, membra inprimis, quæ tumore sæpius correpta neque se flectere, neque omnino flecti possunt; sanguinis missio, cum diluentibus, ac regimine antiphlogistico asperiore, trium fere hebdomadarum spatio incolumitatem præstant, maximeque si inter principia ægrum male habuerint universi corporis dolores.

In genere bilioso, nec durus est pulsus, nec æqualis; dolores non constant; nec tumor aliquis membra corripit. Adversus hoc genus, tum propria experientia, tum ex aliorum observatis compertum habeo, sales neutros cum rhabarbaro inter optima esse præsidia; bilem enim, nisi si quod peccat acrimoniam appellare mavis (non laboro de nomine) præ omnibus potenter ac celeriter ex habitu educunt.

Est et aliud genus, quod spasmodicum cognominarem, quo scilicet pars quædam
corporis

corporis convellitur, arctiusque contrahitur; dorsum puta, cervix, aut humerus. Et verius id quidem statim temporibus reverti dici potest, quam unum atque eundem tenorem servare. Perraro sanguis crassamento coriaceo obtegitur: pulsus parum turbatur. Pendet præcipue curatio ab opiatim rite administratis, ab idoneo pulveris valerianæ filvestris usu, vel ab apte adpositis vesicatoriis.

Quartum porro est genus, fonticulis solis amovendum. Quibus hoc genere ægrotantibus fonticuli, quacunque de causa antea facti, post exaruerint, iis tandem necesse est ut denuo aperiantur, siquidem nullo alio pacto sit sanitas recuperanda.

Supervacaneum forsân videbitur meminisse, dolores a lue venerea provenientes sæpenumero pro meris rheumaticis falso haberi. Tales inuncto mercurio, in modum tamen quem ultra progredi fas non

L

est,

est, vel haustis fortibus radicis sarsaparillæ decoctis, certo, tuto, cito pelluntur.

Arthriticam quandam rheumatismi speciem videre plus semel contigit, cujus de natura aut curatione me prorsus nescire confiteor; doletque, miserorum laborantium ergo, alios cernere de arte medica optime merentes juxta mecum ignorare. In hoc tamen ipso, sicuti et in genere inflammatorio, post alia multa inani opera experta, plurimum profeci hac compositione;

R. Aquæ fontan. unc. vi.

Sal. nitr. drachm. i.

Tinct. antimon. acris (Pharmacop. Paris.) drachm. i.

Spec. contrayerv. drachm. semis.

Sacchar. alb. drachm. ii.

Misce. Pars quarta sumatur sexta quaque hora.

Adolescentula

Adolescentula quædam, neptis ministræ primariæ honoratissimi Comitis de Gower, ex rheumatismo, quo per sex menses laboraverat, ad salutem reducta est saccharo potissimum aconiti Stoërckiano; idque post optima nostrorum consilia irrita sæpius atque elusa. Eodem saccharo ex intervallis parva copia exhibito sanavi Thomam Hayes apud Richmond-park Lodge, cui medicamenta nulla unquam profuerant. Effusissime sudavit uterque æger.

Kal. Julii 1782.

DE Catarrho contagioso, qui, dum hæc super rheumatismo typis mando, levior esse incepit, pauca quædam in transcurso sunt attingenda.

Mense Maio, et ad finem usque Junii, in hac urbe, in agris, et per omnes fere boreales Europæ populos, febris sæviebat catarrhalis; quo morbo nunquam vidi magis epidemice grassantem. Non enim illa optimatibus, neque infimæ fortis plebi pepercit, neque qui-

bus magis erant validæ fibræ, neque quibus infirmiores. Quare hunc occupaverit, illum intactum reliquerit, tot licet inter ægros per hebdomadas quinque versatus, nondum didici. Ii certe quorum maxime purum videbatur temperamentum, quibusque humores haud ita facile fervecebant, malo minimum opportuni erant. Ex convictu aut societate de corpore in corpus fluxisse non videtur.

Qui ex recentioribus longe luculentissime de morbis epidemicis differuit, medicus præclarus Joannes Huxham, inter insignia alia innumera, verbis utitur sequentibus, quæ ideo exscribo, quia ad hujusmodi malorum initium, et causam, et ingenium explicandum, cum maxime faciunt :

“ Ex humida valde et minus elastica aeris
 “ constitutione,” inquit ille, “ sanguinis len-
 “ tor nimius producit facile; unde circu-
 “ latio per vasa minima haud expedita, per
 “ majora autem debito rapidior, eaque aucta
 “ plurimum a suscepto frigore, perspirabile
 “ subito reprimente. Unde paroxysmus se-
 “ quitur febriculofus; qui tamen brevi fa-
 “ cessit, amotis nimirum repagulis, et con-
 “ sequente sudore, nisi aut sanguis sit lentus
 “ valde aut viscidus: tunc enim vel putrida
 “ ac

“ ac lenta febris, vel ardens ac vehemens,
 “ subsequitur; prout nempe fibrarum tonus,
 “ magis minusve elasticus, et status humo-
 “ rum disposuerit.” *Observ. de Aere et Mor-*
bis Epidem. p. 20.

Atque ita quidem hac tempestate res se habuit. Primas ingruentis mali significationes dederunt, susceptum quasi frigus, sternutamenta, narium fluor, raucedo, cum tussi, sputo, spiritibusque animalibus dictis plus minus affectis.

Ex tot hominum millibus, per regiones disjunctissimas simul correptis, satis constat, halitum quendam, seu auram malignam, coeli tractu corrupto, mortalium corporibus incubuisse. Unde horrores extiterunt, vagique per membra in aliis, et in aliis per corpus universum dolores, atrox insuper cephalalgia, necnon in plurimis animi defectus, ab eo haud multum discrepans, qui putridi generis febres antecedit et comitatur; quæ fere symptomata una cum tussi dura morbi curriculum absolverunt. Nec is fane diutinus erat, si modo tussim excipias, atque animi defectum, quæ, ceteris submotis symptomatis, multos adhuc infestos habebant. Major namque pars ægrotorum, post calidas hora somni et diluentes epotas potiones, copiosius

piofius infudando, brevi confirmati funt ; quod et nonnullis contigit fine his.

Morbus, quantum ad vim ejus fpectat, fudorem Anglicum referebat, fimilique ratione folutus eft intra triginta fex, vel octo et quadraginta horas. Non omnibus tamen æque feliciter res vertit. Ubi enim aliæ quævis causæ vel fanguinem in nonnullis æquo fpiffiorem reddiderant (in iis præfertim vegetis, qui mediam excefferant ætatem) vel fuccos in aliis putridos effecerant ; ibi vitium in talibus conceptum mephitica aeris constitutione in motum cieri videbatur, inque peripneumonias, phrenesin, aut febres putridas erupit. Horum ægrorum alteri totas regiminis antiphlogiftici vires defiderabant, cum fanguinis detractione, falibus neutris, diluentibus, fummaque abftinentia ; alteri autem methodum antifepticam rigidiffimam, vel medium quoddam iter, quo tamen itinere maxima nonnunquam inflammationis fymptomata protinus in putredinem confederunt.


Mali vehementiam omnem perpeffus, tam de his loquor quæ ipfemet fenfi, quam quæ oculis fidelibus fubjiciebantur. Sanitatem aliquot ante hebdomadis lætus recepi,

co

Varians Columnæ Mercurialis altitudo.

menfe *MAIO* 1782;

Ex Automato Barometrico ingeniofiffimi viri *ALEX.^{RI} CUMMING.*



W. C. C. C.

2 AU 58

eo lætior, quod cives undique exultantes cernerem propter pulchram illam et spectabilem de Gallis reportatam victoriam navalem, Rodnæo duce, quem nulla tacebunt secula, cujus ad lectum, iniqua valetudine conflictantis, noctesque diesque sæpenumero adstiti.

Vos medici clari Petropolitani, Berolinenses, et Vindebonenses, apud quos caput suum primum extulit hæc contagio, historiam ejus, eique regimen idoneum impertimini, ut mutuis in unum collatis observationibus, eandem, si denuo redeat, minus formidolosam reddamus; ex ea etenim, in partibus insulæ nostræ demissis et uliginosis, plurimi occubuerunt. Illud interim lætandum est, eam nos verno tempore invasisse, quum magis ad inflammationem inclinarent corporum succi quam ad putrorem.

SALIIUM USUS INTERNUS.

ARTIS chemicæ peritis historiam corporum salinorum permittimus, ut et illorum divisionem in simplicia et composita, acida et alkalina. Ad eosdem relegamus acidorum subdivisiones, quas vocant, in vitriolica, nitrosa, muriatica, et vegetabilia; alkalinorum rursus in fixa (sive vegetabilia, sive fossilia) et in volatilia. Penes eosdem itidem esto salia neutra definire, quibus neque acidi insit neque alkali vis, de ceterisque omnibus speciebus, in quas salia distribuere placuit, subtiliter commentari.

Mihi satis est summatim observare, substantias salinas locum principem tenere in omnium fere morborum sanatione, tam acutorum quam longorum; quique illas nesciat utrobique administrare, hunc ex ordine medico esse movendum.

Neque

Neque solus ego de salibus sic censeo. Scribit Fredericus Hoffman, chemicus illustris, idemque medicus experientissimus, ex omnibus medicamentorum generibus, varia etiam arte conquiritis, nulla dari usui medico, in morbis tam aver- tendis quam tollendis, singulariter ac- commodata, quæ cum salibus comparari possint; neque ex hisce omnibus ulla esse putat, a quibus major virtus, salus, et tutior medendi ratio, peti et expe- ctari possint, quam ab iis quæ mediæ indolis sunt, et Neutra vocantur, adeo ut omnis fere, quæ a medicamentis de- sideratur, virtus, etiam cathartica, in iis resideat. Vide ipsum De salium medio- rum eccellente in medendo virtute. His subjicere libet, talia, siquid aliud in re- rum natura, vitale illud quæsitum alka- hestum continere.

Haud inficior, salinis corporibus certas quasdam a medicis nostratibus et chemicis

M

concedi

concedi virtutes. Nequeo tamen quin constanter adfirmem, istiusmodi corporibus meritas suas laudes nequaquam obtigisse, utilitates eorum magnas multasque non abunde monstratas esse, neque ingenia atque discrimina explanate satis determinata.

Medicos conspicuæ alias famæ semel atque iterum vidi, qui salium neutrorum purgandi tantum respicientes vim, magno habuerunt in pretio sal Glauberi, Epsomense, vel Rupellense, posthabitis omnino sale polychresto, tartaro solubili, tartaro regenerato, vel sale diuretico Pharmacopœiæ Londinensis: quæ ipsa quotidiano prope usu comperio febres multas putridi, nonnullas inflammatorii generis, haud paucos etiam ex morbis iis qui ægros diu ac pessime habent, radicitus tollere.

Enimvero, si primæ erunt solum purgandæ viæ, aut alvus compressa fortiter
 solvenda

solvenda est, sal Glauberi, Epsomense, vel Rupellense præcipio ; sperato tamen potissimum commodo pro majore vel minore stercoreum copia. Quod si corpus volo solutum servare in pleuritide, peripneumonia, phrenitide, aut alia qualibet febre inflammatoria, sal polychrestum per se impero, vel nitro conjunctum, pro ratione febrilis æstus dejectionumque desideratarum.

Si viscidos humores, aut bilem tenacem, resolvere animus est, tartaro utor solubili, crystallis ejusdem, aut cremore. Si major accessit putredo, uberiorque ciendus erit urinæ fluxus, ad tartarum decurro regeneratum. Si denique sanguinis insignem aliquam, ut in hæmorrhagiis, ebullitionem cohibere cupio, vel progredientem putredinem, nimiamve succorum resolutionem, valentius compefcere, fit statim transitus ad tartarum vitriolatum ex præscripto Pharmacopœiarum.

SANGUINIS

SANGUINIS MISSIO.

Phyfiologos inter et practicos diu acriterque controversum est, an ex sanguinis emissi facie certi aliquid innotescat de magis accommoda curandi ratione, sive de venis iterum necne incidendis. Hi profecto disputatores, dum theorias inter se diversissimas scriptis innumeris stabilire student, pene omnes mihi videntur facta medica aut omnino prætermisisse, aut sua ipsorum experimenta in aliud detorsisse.

In nosocomiis apud Gallos vidi quasi rivos sanguinis profundi, repetitamque toties venæ incisionem in morbis quam maxime putridis, ut ægri jam jam morituri viderentur. Ipse contra crebra detractione plurimos a morte eripui, ubi scilicet sanguis magnopere viscidus talem detractionem flagitare videbatur. Animo
autem

autem meo hisce omnibus in casibus satis semper supraque factum est, dum id agerem, quod adstantes, si non temerarium inconsultumque ducerent, saltem improbarent.

Mulier quædam Clarke in New-street Covent-garden morbo laborabat, cui signa omnia erant summæ inflammationis, nisi quod dempto sanguini, qui laxioris erat contextus, super incumberet cærula quasi membranula. A venis iterum secandis sedulo temperavi. In febrem intermittentem malignam subito morbus conversus est, cui cortex Peruvianus remedio fuit, ex eo statim temporis puncto, quo febris indolem symptomata ostendebant.

At longe aliam ingredi visum est viam, ægrotante Ludovico Stanislao De la Rochette. Huic arteriarum erat pulsus æqualis, nec febrem celeritate, nec plethoram duritie indicans; dolor vero obscurus in sinistra parte abdominis sentiebatur. Re-

spiratio

spiratio facilis et libera illæsos pulmones et pleuram arguebat. Extractus sanguis, summopere viscidus, crustaque coriacea obductus, ex familiaribus ejus peritissimum chirurgum admonuit, periculum instare. Venis iterum iterumque incisis, salibus neutris, et mediocriter purgantibus sæpius administratis, anxii tandem reddimus amicis virum ingenio jucundo, varia eruditione, morumque singulari comitate insignem.

Ex sententia Bellini, sanguis mittendus est in nullo non morbo, ubi vel copia ejus minuenda est, vel velocitas augenda; vel æger est refrigerandus et humectandus; vel aliquid vasis adhærescens movendum et auferendum; vel ubi particulæ quæ sanguinem componunt, magis inter se miscendæ sunt, aut immutandæ.

Ut rem in pauca conferam, quicumque medicus jacentium lectos accedit, nescitque venæ incisæ mechanicos in laticis sanguinei

guinei texturam effectus ; aut qui temere in animum induxerit, nullas esse de curatione colligendas significationes ex crassamenti ejus et feri colore, vel ex partium tenuitate aut lentore ; is medius fidius ab omni morbo inflammatorio, ut et a plerisque putridorum curandis, in totum abstineat.

Excruciabatur hernia humorali juvenis illustris. Sanguis ad duodecimam usque vicem detractus, alimenta que vix ulla concessa, pulsus celeritatem aut duriem haudquaquam minuebant. Incisionibus decima tertia et quarta, animo eum deficiente, febris soluta est. Per totum morbi decursum nullum passus erat spirituum languorem. Binis ternisve post annis febris putrida correptus, animumque, ut in ejusmodi morbis consuevit, despondens, ne unam transigere noctem ausus est, nisi medico propter adsidente. Convaluit sine sanguinis missione.

S O M N U S.

S O M N U S.

COnvenit inter omnes, nihil magis ad hoc usque tempus in medicina desiderari, ut submoveantur multa gravissima mala, quam somni arcessendi facultatem. Mille, ut verum fateamur, ducentis abhinc annis, ævo nempe Aretæi Cappadocis, tantum fere de hac re innotuit, quantum summis obtigerit hodiernis magistris.

Quidquid sanguinem circumeuntem nimium propellit; quidquid nervos crebrius aut fortius agitat; quidquid perspirationem Sanctorianam, five noctu five diu, quam minime cohibet; quidquid flatum intestinorum gignit; quidquid denique ventriculum prægravat, vel coctionem quomodocunque impedit; ea singula, magisque multo si inter se nexa et jugata,

jugata, vigiliarum in causa sunt. Et alia sunt quædam, non satis a medicis intellecta, quæ somnum similiter prohibent.

Si adest febris; vix dicere est, quantum molestiarum, angoris, ac periculi, e vigiliis oriatur. Ubi ea est nulla; quis non vidit, quam misere spasms nervi turbentur, quamque gravia afficiant symptomata hysterica, hypochondriaca, melancholica, et maniaca, deficiente per membra placidæ quietis irrigatione?

Alibi meminimus tartari solubilis vim præclaram febrientibus somnum conciliandi, rationemque ostendimus qua sit id exhibendum. At vero præ tartaro solubili, præque omnibus adhuc repertis soporiferis, Pilulæ Stomachicæ, jam ante memoratæ, suaviter consopienti virtute præditæ sunt, ultra quam nisi expertis credere liceat.

VARIOLÆ.

ETSI variolarum naturæ nova multa hac ætate adfusa sunt lumina, unde in illis curandis, five inferendo arcessitæ sint, seu suapte sponte advenerint, nostrates tantos fecere progressus; nihilo-minus tamen parum mihi liquet, practicos ad humorum temperiem, qualis ea sit, animos satis attendere.

Neque iidem mihi magis videntur periculum præcavere, e methodo antiphlogistica vel antiseptica, si hanc aut illam plus nimio insistant, frequentius oriturum; præcipue ubi a teneris unguiculis eatenus infantes carnibus insueverunt, ut, dum ad maturitatem tendunt pustulæ, negatis his, vix vita vitalis dici queat.

Pustulis maturescentibus, vidimus sæpe necessitatem, juxta atque utilitatem, ægro-
tantibus

tantibus ex infitione victum indulgendi, sanctis summorum ejus generis artificum legibus quam maxime adversantem. Quandoque etiam coacti sumus sanguinem copia bene larga educere, ne ex eo nimis viscido noxa cerebro aut pulmoni inferretur.

Olim quum tot ubique strages ederet funesta hæc lues, hisce talibus diligentius forsan advertebatur, quam his temporibus, quibus tota pendet curatio ab aere refrigerante et regimine antiphlogistico.

Corticem Peruvianum, vinumque rubrum Lusitanicum, gravissima sæpe amotura symptomata, res confessa est. Reperiuntur tamen, qui ad affectus nervosos adeo natura sua feruntur, ut, nisi opiatis tollatur orgasmus seu ataxia nervorum (uti loquitur Sydenhamus) ægri nullo modo sunt leto redimendi.

Administratis opiatis mulierem quandam Rix in Stafford-row, quæ nativis variolis laborabat, ad sanitatem perduxì. Ejus-

dem foror, cui morbus arte inductus, fato ante interierat; omisso, ut opinor, opiatorum usu.

§.

Filio Joannis Drummond apud Charing-cross contagium per insitionem communicatum est; raris sparsis hinc inde pustulis. Puero moriendum erat, ni statum versus carnes edendas concessissem. Nihil maturationem promoverant cortex, vinum, aut acida; neque spiritibus animalibus opiata profuerant.

§.

E famulis meis adolescentulus, annos habens septemdecim, solita naturæ via morbo hoc tenebatur. Ut delirio atque signis peripneumonicis obviam iretur, sexies progrediente maturatione incisæ sunt venæ. Crassamentum singulis vicibus in crustam coriaceam se induebat. Sanguine licet toties dempto, pustularum maturatione minima ex parte impedita est.

VENTRICULUS.

V E N T R I C U L U S .

QUædam Bagley, in vico Rutlandiæ
 Manton, ætatem mediam egressa,
 alternis quibusque per triennium hebdo-
 madis, acerbissimo ventriculi dolore cru-
 ciata erat; junctis vomitionibus eo usque
 incitatis, ut neque cibum, neque potum
 qualemcunque, vel dimidiam horæ partem
 continere posset. Dum miseris his modis
 plecteretur, nihil unquam alvus demisit.
 Quæ autem rejiciebantur, singulari illa
 proprietate donata sunt, ut factum ex
 argento cochleare nigro colore inficerent.
 Imperavi sexaginta guttas olei tartari per
 deliquium ex infusione florum chamæme-
 linorum quotidie sumendas, una cum pi-
 lulis ex limatura ferri non rubiginosi,
 simul et herbarum amararum extractis.
 Hinc purgata est per primam hebdomadem
 se-

sexies septiesve de die. Paulatim dein ita inclinavit medicamenti vis, ut tandem semel tantum in die desideret. Jamque liberata est. Elapso fere mense, priora visa sunt quasi recrudescerent symptomata, quibus finem omnino adtulit oleum tartari per deliquium ex infusione florum chamæmelinorum.

§.

Mulier alia Lee apud Farndon in comitatu Leicestriensi pertinaci quodam ventriculi acido humore pessime habita est, quem tamen submovit cortex Peruvianus. Si quando rediret, ab eodem remedio palmario actutum pulsus est.

VESICATORIA.

V E S I C A T O R I A .

UBI brachium in hemiplegia potissime afficitur, vesicatorium amplum cervici, qua nervi ad brachia tenduntur, injectum, optatissime nonnunquam respondet. Hoc auxilii genere firmitatem corporis receperunt agricola Uppinghamiensis Burton, pauperculus novem annorum apud North Luffenham, alique complures, quorum nomina festinante nimis calamo in adversaria non retuleram.

Nusquam comperi vesicatoria æque cito prodesse, atque in acutis pulmonum morbis, post commodam sanguinis missionem cruribus adposita. Convenit hoc Hippocraticæ disciplinæ: “ Quod tumores ad furas, &c.

U N G U E N T A .

U N G U E N T A.

VIX reperias unguentum in Pharmacopœia Londinensi plagis aut ulceribus sanandis omnimodo accommodum.

Rodit unguentum basilicum flavum præ nimia acrimonia. Adde, quod durities ejus nervorum papillas corrugat, ac carnis productionem impedit.

Unguentum e gummi elemi vix mollius est textura, aut lenius quod ad effectus.

Unguentum basilicum nigrum non satis deterget. Recentem porro carnem nimis relaxat.

Indita cavis ulceribus linamenta, nisi balsamo aliquo prius imbuta sunt, ultra debitum siccant. Eadem ut plurimum pulchre conveniunt, ubi caro recens bonique coloris justo citius increscit.

Vulnere inflicto, aut rupto apostemate, simulque etiam in omni fere ulcerum statu,
maximum

maximum adfert lenimen unguentum
sequens. Non nimium deterget, ac par-
ciores copia adhibitum carnem alit.

R. Unguent. basilic. nigr. Pharmacop. Lond.
semunc.

Unguent. e gum. elemi ejusd. Pharmacop.
Mel. Anglic.

singulorum unc. i.

Leni calore simul solvantur, et diligenter mi-
sceantur, dum frigeant; ut fiat unguentum
detergens, quod fratrem meum Joannem
Fordyce auctorem agnoscit.

Non prætermittendum est, quod et
alii animadverterunt, argentum vivum
cum balsamo sulphuris tritum, in un-
guento cæruleo fortiori Pharmacopœiæ
Londinensis, ad luis venereæ sanatio-
nem aliquando non sufficere.

Minime placet quadruplum axungiae
porcinæ pondus in unguento cæruleo
mitiori, propter summam difficultatem
tantam ejus copiam ad ficcitatem infri-
candi.

VULNERA.

GEORGIUS Oylett tertiæ cohortis
 prætorianæ miles, dum fœderatorum
 exercitus anno M, DCC, XLVIII ad Bra-
 bantiæ vicum Nessleroi castra haberet,
 in abdomine graviter acinace vulneratus
 erat. Interposita semihora, inveni eum
 magnam intestinorum partem, ne penitus
 evolverentur, cavo galero suffulcientem.
 Valde illa inflata, omentumque pulvere
 conspersum; ante quod discissum, in se-
 des suas intestina nullo modo condere
 potui, tametsi per se late patebat plaga.
 Ex cibo et potu, quibus se paulo ante
 liberaliter invitaverat, venustissima sane
 vasorum lacteorum facies per mesenterium
 disperforum. Repositis omnibus, quum
 sanguis fatis multus ex omenti arteriis
 adhuc flueret, acu prælonga futuram feci
 interruptam dictam; id quod ægerrime
 fiebat,

ſiebat, propter ſponte ſe retrahens peritonæum, et ipſam muſculorum abdominalium craſſitudinem. Fomentis adhibitis, oviumque recens cæſarum pellibus hominem in dies obvolvendo, in integrum iſ reſtitutus eſt.

§.

Ejuſdem cohortis decurio ſingulari certamine vulnus in regione gaſtrica accepit. Sanguis fuſſum deorſum ubertim redditus eſt. Putabant qui eum inviſerunt principes caſtrenſes chirurgi, cum ventriculo et jecur confoſſum. Repugnantibus omnium auguriis, aſperi regiminis antiphlogiſtici ope ad ſanitatem pervenit.

Diu invaluit opinio, immedicabilia eſſe ventriculi vulnera : quod non ex toto ita ſe habere hoc exemplum oſtendit.

§.

Adoleſcentulus, cujus eminebat genus, quum annos circiter quindecim haberet, ab equo excuſſus, mutus exceptus eſt,

ossi parietali vulnere inflicto. Quæ subsequuta sunt indicia, apud chirurgum, cui commissa curatio est, non satis valebant, ut rem terebra tentaret. Abierunt sex menses. Paulatim deinde accedebant capitis dolores, demissio animi, graves nervorum affectus; quæ cum redeuntibus vere et autumnio pari passu redibant. Post biennium alta infedit melancholia; desperatione mentem quandoque sic invadente, ut propinqua cognatione conjunctis, ne quid in se durius admitteret, metus injiceretur. Tum denique arcessitus, atque hæc omnia edoctus, familiam judicio meo impertivi: Veri nempe simillimum esse, cuncta ea symptomata inauspicato isti ex equo casui deberi, meque suspicari, calvariam membranis cerebrum contingentibus inniti adhuc et incumbere. Ideo perforandum esse duxi. In consilium postea adhibiti Cæsar Hawkins, Richardus Saunders, et Joannes Hunter, uno
ore

ore consentiebant, ex illo ministerio multo plus bonæ spei adfulgere, quam periculi intentari: adeoque Joannes Hunter ad marginem depressæ cranii partis (restabat manifesta depressio) terebram adegit. Tulit æger constanti animo; regimine autem antiphlogistico mala quæque symptomata arcebantur. Quum vero non exempta esset nisi pars exigua ossis defidentis, quod nunc fractum fuisse, et contactu sui cerebrum violasse, certo comperimus; consultum visum est rem iterum aggredi, ut sublata residua parte, symptomata, quorum causa hanc primum instituissemus medicinam, penitus devincerentur. Adolescentulus constanter omnia ac fortiter; demptumque omnino est id quod ex osse jam facto crassiore reliquum erat. Ex hac altera perforatione acres admodum moti sunt dolores; quos excepit febris gravissima repetita sanguinis missione, et asperrimo regimine, tantummodo cohibenda. Diffusa

cussa fēbre, æumnarum quas perpeſſus erat omnium is cito pretium cepit, mentis et corporis fanitatem incorruptam; qua hodie fruitur, haud ita pridem a Calpe reverſus, ubi, ſine ulla cerebri inter tot tormentorum militarium tonitrus offeſione, magno imperatore non indignum ſe militem præſtitit. Addere eſt, vix dum exciſum eſſe quod a prima perforatione ſupererat fruſtulum, quum ab omni ægritudine ſolutus miro quodam ac ſubito gaudeo exultaret.

2 AU 58

F I N I S.

